

試管週期-短療程 (月經第 2 天起開始用藥)

植入時間為取卵後 2-5 天左右, 由醫師決定.

	月經第 1 天	第 2 天	第 3 天	4	5	6	7	8	9	10	11	12	取卵前 1 天	取卵當天中午到 空腹 8 小時	取卵後 1 天	取卵後 2 天	取卵後 3 天	取卵後 4 天	取卵後 5 天	6	7	8	9	10	11	12	13	取卵後 14 天	取卵後 16 天	取卵後 23 天	取卵後 30 天		
														看受精	胚胎植入	胚胎植入		胚胎植入										抽血驗孕	抽血驗孕	看胚胎	看心跳		
抽血		抽血				抽血		抽血		抽血		抽血															HCG	HCG	HCG				
超音波		超音波				超音波		超音波		超音波		超音波															看報告		超音波	超音波			
噴藥		噴	噴	噴	噴	噴	噴	噴	噴	噴	噴	噴																					
打針					FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH																					
破卵針													◎			○			○														
胚胎植入																	植入		植入														
術後藥													■	■	■	■																	
黃體素-快孕隆 Crinone 8% (塞)													晚 1	晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1
黃體素-優潔通 Utrogestan (口服)														早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1		
雌激素 Estrade (口服)															早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	

註: 抽血/超音波/打針劑量依個人實際追蹤狀況決定. 請依照醫師指示開始用藥及停藥. 抽血請早上 9 點前抽好. 下午 4-5 點後回診照超音波. (請記得帶抽血單).

註: 噴藥(舒培盟)從月經第 2 天晚上開始噴及睡前, 隔天開始改 1 天 4 次, 每次噴左右鼻孔各 1 下.(吸入式) 有任何問題請來電找實驗室小姐. 03-5353-532

註: ◎ 破卵針 hCG 6500IU (Ovidrel 克得諾) ○ hCG 1500 IU (Ovidrel 克得諾)(3 天打 1 次, 共打 3 次, 固定時間打) 請照醫師指示.

註: 黃體素連續用 14 天以上到抽血驗孕 β-HCG 當天, 未孕即可停止; 若懷孕則繼續使用到穩定. 註: ■: 取卵術後藥有 3 種(止痛藥 / 抗生素 / 胃藥) 3 天份要按時吃完.

註: 注意卵巢過度刺激 可能發生於取卵後, 卵子較多的較容易發生, 請記得每天多補充蛋/肉及含蛋白質的水分. 若喝 1500cc 的水分, 尿出來約要 1000cc.

若尿量少於 500cc 以上, 或腹痛腹漲請馬上回診.

試管週期-拮抗劑療程 (月經第 2 天起開始用藥)

植入時間為取卵後 2-5 天左右, 由醫師決定.

	月經第 1 天	第 2 天	第 3 天	4	5	6	7	8	9	10	11	12	取卵前 1 天	取卵當天中午到 空腹 8 小時	取卵後 1 天	取卵後 2 天	取卵後 3 天	取卵後 4 天	取卵後 5 天	6	7	8	9	10	11	12	13	取卵後 14 天	取卵後 16 天	取卵後 23 天	取卵後 30 天				
看受精情形														看受精情形	胚胎植入	胚胎植入		胚胎植入										抽血驗孕	抽血驗孕	看胚胎	看心跳				
β-HCG																											β-HCG	β-HCG	β-HCG						
看報告																											看報告		超音波	超音波					
FSH		FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH																							
Cet					Cet	Cet	Cet	Cet	Cet	Cet	Cet	Cet																							
◎													◎		○			○																	
○																植入		植入																	
■														■	■	■	■																		
晚 1														晚 1	晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	
中 1 晚 1														早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1		
早 3 晚 3															早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	

註: 抽血/超音波/打針劑量依個人實際追蹤狀況決定. 請依照醫師指示開始用藥及停藥. 抽血請早上 9 點前抽好. 下午 4-5 點後回診照超音波. (請記得帶抽血單).

註: 拮抗劑(Cetrotide 欣得泰) 依照卵泡大小>10 mm 決定何時開始打. 有任何問題請來電找實驗室小姐. 03-5353-532

註: ◎ 破卵針 hCG 6500IU (Ovidrel 克得諾) ○ hCG 1500 IU (Ovidrel 克得諾)(3 天打 1 次, 共打 3 次, 固定時間打) 請照醫師指示.

註: 黃體素連續用 14 天以上到抽血驗孕 β-HCG 當天, 未孕即可停止; 若懷孕則繼續使用到穩定. 註: ■: 取卵術後藥有 3 種 (止痛藥 / 抗生素 / 胃藥) 3 天份要按時吃完.

註: 注意卵巢過度刺激 可能發生於取卵後, 卵子較多的較容易發生, 請記得每天多補充蛋/肉及含蛋白質的水分. 若喝 1500cc 的水分, 尿出來約要 1000cc.

若尿量少於 500cc 以上, 或腹痛腹漲請馬上回診.