

一. 解凍植入週期或受贈卵子新鮮植入試管週期

植入時間由醫師來決定. 107.8.25 版

月經	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天	第 6 天	第 7 天	第 8 天	第 9 天	第 10 天	第 11 天	第 12 天	第 13 天	第 14 天	第 15 天	第 16 天	第 17 天	第 18 天	第 19 天	第 20 天	第 21 天	第 22 天	第 23 天	第 24 天	第 25 天	第 26 天	第 27 天	第 28 天	隔 2 天	隔 7 天	隔 7 天	隔 7 天	隔 7 天				
日期																																					
抽血		抽血						抽血			抽血			抽血																							
超音波		超音波						超音波			超音波			超音波																							
雌激素 Estrade (口服)			早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 2 晚 2	早 2 晚 2	早 2 晚 2	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3		
黃體素-快孕隆 Crinone 8% (塞)														晚 1	晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1		
黃體素-優潔通 Utrogestan (口服)														早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1			
捐卵者取卵日 -取精 D3 或 D5 胚胎植入														取精				D3 植入		D5 植入																	
術後藥有 3 種 止痛藥 / 抗生素 / 胃藥		口服													1	1	1	1	1																		
鐵劑/葉酸		口服																																			/
阿斯匹林		口服																																			
其他																																					

註: 請於早上 9 點前**抽血完成**, 下午 4~5 點或晚上 7 點半**回診照超音波**。(抽血請記得帶已繳費好的檢驗單), **每次回診請事先跟門診小姐預約**。

註: **雌激素 Estrade** 早晚各 1-3 顆, 數量是依個人實際追蹤子宮內膜厚度決定. 請依照醫師指示開始用藥及停藥. 有任何問題請來電找實驗室小姐. 03-5353-532

註: 黃體素 2 種 (快孕隆 **Crinone 8%** / 優潔通 **Utrogestan**); 連續用 14 天以上....到抽血驗孕 β -HCG 當天, 未孕即可停止; **若懷孕則繼續使用到穩定**。

註: ■: 術後藥有 3 種. (主要是減少子宮環境的細菌)

註: 受贈卵子取卵日當天, 先生下午 3 點半要取精液。

註: 亦可以採 NC-自然週期方式追蹤子宮內膜厚度達 0.9 公分以上再安排解凍胚胎植入日期. (好處是懷孕後黃體素及雌激素的補充時間較短, 醫師會依據個人懷孕狀況穩定度決定停藥方式及劑量). 會打破卵針 © hCG 6500IU (Ovidrel 克得諾), ○ hCG 1500 IU (Ovidrel 克得諾)(3 天打 1 次, 共打 3 次, 固定時間打) 請照醫師指示。

二. 試管週期-解凍(捐卵)(卵銀)

植入時間由醫師來決定. 104.6.22 版

	月經第1天	第2天	第3天	4	5	6	7	8	9	10	11	12	取卵前1天	假設今天是取卵日(取精日)	取卵後1天	取卵後2天	取卵後3天	取卵後4天	取卵後5天	6	7	8	9	10	11	12	13	取卵後14天	取卵後16天	取卵後23天	取卵後30天		
																	解凍植入	解凍植入										抽血驗孕	抽血驗孕	看胚胎	看心跳		
抽血		抽血						抽血		抽血		抽血																β-HCG	β-HCG	β-HCG			
超音波		超音波						超音波		超音波		超音波																看報告		超音波	超音波		
噴藥																																	
破卵針 採NC才打													◎			○		○				○											
取卵/取精																																	
胚胎植入																	植入	植入															
術後藥3種														■	■	■	■																
黃體素2種														P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
雌激素			E1	E1	E1	E1	E1	E1	E2	E2	E2	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3

註: 抽血請早上9點前抽好. 下午4點~5點或晚上7點回診照超音波. (抽血請記得帶已繳費好的檢驗單). 每次回診請事先跟門診小姐預約.

註: E1-E3 雌激素 (Estrade 早晚各1-3顆), 數量是依個人實際追蹤子宮內膜厚度決定. 請依照醫師指示開始用藥及停藥. 有任何問題請來電找實驗室小姐. 03-5353-532

註: P: 黃體素2種 (快孕隆 Crinone 8%-早晚各塞1支 / 優繫通 Utrogestan 早中晚各吃1顆); 連續用14天以上....到抽血驗孕 β-HCG 當天, 未孕即可停止; 若懷孕則繼續使用到穩定.

註: ■: 術後藥有3種 (止痛藥 / 抗生素 / 胃藥) 3天份要按時吃完. (主要是要減少子宮環境的細菌..)

註: 亦可以採NC-自然週期方式追蹤子宮內膜厚度達0.9公分以上再安排解凍胚胎植入日期. (好處是懷孕後黃體素及雌激素的補充時間較短, 但時間醫師會依據個人懷孕狀況穩定度決定停藥方式及劑量).

但採NC自然週期會打破卵針 ◎ hCG 6500IU (Ovidrel 克得諾) ○ hCG 1500 IU (Ovidrel 克得諾)(3天打1次, 共打3次, 固定時間打) 請照醫師指示.